


TORVACARD®

ATORVASTATINUM



EZEN®

ezetimibe





TORVACARD®
ATORVASTATINUM

EZIEN®
ezetimibe

Występowanie chorób, **czynniki ryzyka** lub 10-letnie ryzyko w skali Pol-SCORE
oraz **rekomendowana terapia hipolipemizująca**.*

**RYZIKO
NISKIE**

**RYZIKO
UMIARKOWANE**

**RYZIKO
WYSOKIE**

**RYZIKO
BARDZO WYSOKIE**

**RYZIKO
EKSTREMALNIE
WYSOKIE**

- Bez dodatkowych czynników ryzyka



Statyna w małej dawce

Cel leczenia: osiągnięcie stężenia LDL-C: 115 mg/dl (<3,0 mmol/l)



Występowanie chorób, **czynników ryzyka** lub 10-letnie ryzyko w skali Pol-SCORE
oraz **rekomendowana terapia hipolipemizująca**.*

RYZIKO
NISKIE

RYZIKO
UMIARKOWANE

RYZIKO
WYSOKIE

RYZIKO
BARDZO WYSOKIE

RYZIKO
EKSTREMALNIE
WYSOKIE

- <2 czynniki ryzyka i ryzyko Pol-SCORE <10%



Statyna w umiarkowanej dawce

Cel leczenia: osiągnięcie stężenia LDL-C: <100 mg/dl (<2,6 mmol/l)



Występowanie chorób, **czynniki ryzyka** lub 10-letnie ryzyko w skali Pol-SCORE
oraz **rekomendowana terapia hipolipemizująca**.*

RYZIKO
NISKIE

RYZIKO
UMIARKOWANE

RYZIKO
WYSOKIE

RYZIKO
BARDZO WYSOKIE

RYZIKO
EKSTREMALNIE
WYSOKIE

- ≥ 2 czynników ryzyka i ryzyko Pol-SCORE 10-20%
- Cukrzyca lub PChN w stadium 3-4 bez innych czynników ryzyka



**Statyna w umiarkowanej / wysokiej
dawce + Ezetimib**

Cel leczenia: osiągnięcie stężenia LDL-C: <70 mg/dl ($<1,8$ mmol/l)



TORVACARD®
ATORVASTATINUM

EZEN®
ezetimibe

Występowanie chorób, **czynniki ryzyka** lub 10-letnie ryzyko w skali Pol-SCORE
oraz **rekomendowana terapia hipolipemizująca***

**RYZIKO
NISKIE**

**RYZIKO
UMIARKOWANE**

**RYZIKO
WYSOKIE**

**RYZIKO
BARDZO WYSOKIE**

**RYZIKO
EKSTREMALNIE
WYSOKIE**

- Progresa choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym u pacjentów, u których osiągnięto i stale utrzymywano LDL-C < 70 mg/dl
- Rozpoznany ostry zespół wieńcowy, choroba tętnic wieńcowych, sztywnych lub obwodowych
- Stan po rewaskularyzacji
- Ryzyko Pol-SCORE > 20%
- Hipercholesterolemia rodzinna

- Cukrzyca lub PChN w stadium 3-4 z 1 lub więcej czynników ryzyka
- Wywiad przedwczesnej choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym (w wieku < 55 lat u mężczyzn i < 65 lat u kobiet)
- Rozpoznana choroba sercowo-naczyniowa u pacjentów z cukrzycą, PChN w stadium 3-4 lub hipercholesterolemią rodzinną



**Statyna w wysokiej dawce
+ Ezetimib**

Cel leczenia: osiągnięcie stężenia LDL-C: < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l)



TORVACARD®
ATORVASTATINUM

EZIEN®
ezetimibe

Występowanie chorób, **czynniki ryzyka** lub 10-letnie ryzyko w skali Pol-SCORE
oraz **rekomendowana terapia hipolipemizująca**.*

RYZIKO
NISKIE

RYZIKO
UMIARKOWANE

RYZIKO
WYSOKIE

RYZIKO
BARDZO WYSOKIE

RYZIKO
EKSTREMALNIE
WYSOKIE

- Stan po wielokrotnych incydentach sercowo--naczyniowych i/lub rewaskularyzacjach
- Przewłokowa rewaskularyzacja w szczególnych miejscach anatomicznych (np. chorzy po przewłokowej rewaskularyzacji pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej albo/i choroba wieńcowa wielonaczyniowa (kompleksowe PCI w chorobie wieńcowej wielonaczyniowej)
- Miażdżycza uogólniona – wielu łożysk naczyniowych z dodatkowymi czynnikami ryzyka
- Progresa choroby sercowo-naczyniowej o podłożu miażdżycowym u pacjentów, u których osiągnięto i stale utrzymywano LDL-C < 55 mg/dl



**Statyna w wysokiej dawce
+ Ezetimib Inhibitor PCSK9**

Cel leczenia: osiągnięcie stężenia LDL-C: <35 mg/dl (<0,9 mmol/l)

Mistrzowskie połączenie



**Bezpłatne
dla seniorów**

TORVACARD®
ATORVASTATINUM



OPAKOWANIE: 10 mg x 30 tabl.
ODPŁATNOŚĆ 30%*



OPAKOWANIE: 40 mg x 30 tabl.
ODPŁATNOŚĆ 30%*



OPAKOWANIE: 20 mg x 30 tabl.
ODPŁATNOŚĆ 30%*



OPAKOWANIE: 40 mg x 90 tabl.
ODPŁATNOŚĆ 30%*



OPAKOWANIE: 80 mg x 30 tabl.
ODPŁATNOŚĆ 30%*

EZEN®
ezetimibe



OPAKOWANIE: 10 mg x 30 tabl.
ODPŁATNOŚĆ 100%



OPAKOWANIE: 10 mg x 28 tabl.
ODPŁATNOŚĆ 30%*



**Bezpłatne
dla seniorów**

*Na podstawie: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2019 r. (poz. 65).